

## **Линейные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами**

Как уже отмечалось, в большинстве случаев решения линейного уравнения с переменными коэффициентами не выражаются даже в квадратурах. Поэтому для практики важными оказываются косвенные методы, позволяющие делать заключения о свойствах таких решений без построения их явного вида.

В рамках этой темы мы ограничимся рассмотрением только *вещественных* функций вещественного переменного, что позволит более широко использовать неравенства для описания свойств решений.

Например, если для уравнения второго порядка

$$\ddot{y} + a_0(t)y = 0 \tag{1}$$

имеем  $a_0(t) > 0, t \in \Omega$ , то (согласно известной из курса математического анализа теореме) можно утверждать, что при  $y > 0$  график любого частного решения на  $\Omega$  будет иметь выпуклость вверх, поскольку в этом случае

$$\ddot{y} = -a_0(t)y < 0.$$

Менее очевидные, но также практически полезные методы могут быть применены для исследования *нулей решений*, то есть значений независимой переменной  $t$ , для которых искомая функция принимает нулевое значение.

Далее мы будем рассматривать линейные однородные уравнения второго порядка вида

$$a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = 0, \quad (2)$$

где функции  $a_0(t)$ ,  $a_1(t)$ ,  $a_2(t)$ ,  $t \in \Omega$ , непрерывно дифференцируемы и  $a_2(t) \neq 0$ .

Вначале убедимся, что уравнение (2) может быть приведено к виду (1) при помощи линейной замены искомой функции по формуле  $y(t) = p(t)u(t)$ , где  $u(t)$  – новая неизвестная функция, а

$$p(t) = \exp \left( -\frac{1}{2} \int_{t_0}^t \frac{a_1(s)}{a_2(s)} ds \right). \quad (3)$$

Действительно, если в уравнение (2) подставить  $y(t) = p(t)u(t)$ , то мы получим

$$(a_2 p \ddot{u} + 2a_2 \dot{p} \dot{u} + a_2 \ddot{p} u) + (a_1 p \dot{u} + a_1 \dot{p} u) + a_0 p u = 0$$

или

$$a_2 p \ddot{u} + (2a_2 \dot{p} + a_1 p) \dot{u} + (a_2 \ddot{p} + a_1 \dot{p} + a_0 p) u = 0,$$

то есть получаем уравнение, не содержащее слагаемого с  $\dot{u}$ , поскольку выбранная по формуле (3) функция  $p(t)$  удовлетворяет легко проверяемому равенству  $2a_2 \dot{p} + a_1 p = 0$ .

Для уравнения (1) справедлива

Лемма 1. **Всякое ненулевое решение уравнения (1) может иметь лишь конечное число нулей на любом конечном отрезке.**

Теорема  
1.  
(Штурма о  
сравнении)

Пусть  $t_1$  и  $t_2$  — соседние несовпадающие нули  
некоторого нетривиального решения уравнения:

$$\ddot{y} + a_0(t)y = 0, \quad (4)$$

и пусть функции  $a_0(t)$  и  $A_0(t)$  непрерывны и та-  
ковы, что  $A_0(t) \geq a_0(t) \quad \forall t \in [t_1, t_2]$ .

Тогда любое нетривиальное решение  $z(t)$  уравне-  
ния

$$\ddot{z} + A_0(t)z = 0 \quad (5)$$

имеет нуль хотя бы в одной точке отрезка  $[t_1, t_2]$ ,  
при этом либо этот нуль принадлежит  $(t_1, t_2)$ , ли-  
бо

$$\begin{cases} z(t_1) = z(t_2) = 0, \\ A_0(t) \equiv a_0(t) \quad \text{на} \quad [t_1, t_2]. \end{cases}$$

Следствие **На отрезке, где  $a_0(t) \leq 0$ , любое нетривиальное решение  $y(t)$  уравнения (5.4.1) может обратиться в нуль не более чем в одной точке.**

#### Доказательство

Применим теорему Штурма к паре уравнений

$$\ddot{y} + a_0(t)y = 0 \quad \text{и} \quad \ddot{z} + 0z = 0.$$

Предположим, что первое из них имеет на  $\Omega$  по крайней мере два нуля  $t_1 < t_2$ . Тогда в силу условия  $a_0(t) \leq 0 \quad \forall t \in \Omega$  каждое нетривиальное решение второго уравнения в силу теоремы 1 обязано иметь хотя бы один нуль на  $[t_1, t_2]$ .

Однако легко видеть, что  $z(t) \equiv 1$  – нетривиальное решение второго уравнения – такого нуля не имеет. Следовательно, предположение о том, что первое уравнение может иметь более одного нуля, неверное.

Следствие доказано.

Заметим, что для случая  $a_0(t) > 0$  оценка числа нулей решений уравнения (1) может оказаться более сложной задачей.

Например, для  $\ddot{y} - \frac{2}{t^2}y = 0$  каждое решение  $y(t) = C_1 t^2 + \frac{C_2}{t}$  (такая функция называется «Трезубец Ньютона») в области его определения имеет не более одного нуля, в то время как для уравнения  $y + \frac{1}{t^2}y = 0$  число нулей каждого решения

$$y(t) = C_1 \sqrt{t} \sin(\sqrt{3} \ln \sqrt{t}) + C_2 \sqrt{t} \cos(\sqrt{3} \ln \sqrt{t})$$

(находимого, например, при помощи подстановки  $t^\alpha$  и формулы Эйлера) неограничено.

Следствие 2. (0 чередовании нулей) **В промежутке между любыми двумя соседними нулями одного из двух линейно независимых решений уравнения (5.4.1) содержится ровно один нуль другого решения.**

#### Доказательство

Пусть  $y_{(1)}(t)$  и  $y_{(2)}(t)$  — линейно независимые, нетривиальные решения уравнения (5.4.1). Применим теорему Штурма к паре уравнений вида

$$\ddot{y}_{(1)} + a_0(t)y_{(1)} = 0 \quad \text{и} \quad \ddot{y}_{(2)} + a_0(t)y_{(2)} = 0.$$

(Мы формально положили  $a_0(t) \equiv A_0(t)$ ).

Если  $t_1$  и  $t_2$  — соседние несовпадающие нули первого уравнения, то между ними имеется хотя бы один нуль второго уравнения  $t^*$ . Общих нулей у  $y_{(1)}(t)$  и  $y_{(2)}(t)$  быть не может. Действительно, если, например,  $y_{(1)}(t^*) = y_{(2)}(t^*) = 0$ , то вронскиан  $W(t^*) = 0$  и решения  $y_{(1)}(t)$  и  $y_{(2)}(t)$  линейно зависимые. Поэтому  $t^* \in (t_1, t_2)$ .

Остается доказать, что  $t^*$  единственное. Предположим, что существует также  $t^{**}$  такое, что

$$y_{(2)}(t^{**}) = 0, \quad t_1 < t^* < t^{**} < t_2.$$

Тогда по теореме Штурма у  $y_{(1)}(t)$  должен иметься нуль на  $(t^*, t^{**})$ , что противоречит предположению о том, что  $t_1$  и  $t_2$  соседние нули решения  $y_{(1)}(t)$ . Значит  $t^* = t^{**}$ .

Следствие доказано.

Отметим, что для линейных уравнений порядка большего, чем два ( $n > 2$ ), следствие 2, вообще говоря, неверно. Например, для линейно независимых решений  $y_{(1)}(t) = \sin t$  и  $y_{(2)}(t) \equiv 1$  уравнения  $\ddot{y} + \dot{y} = 0$  чередования нулей нет.

**Следствие 3.** Если некоторое нетривиальное решение уравнения (1) имеет бесконечное число нулей, то и каждое его другое нетривиальное решение имеет бесконечное число нулей.

Проиллюстрируем практическое применение теоремы Штурма следующими примерами.

**Задача 1.** Оценить сверху и снизу расстояние между соседними нулями нетривиального решения уравнения

$$\ddot{y} + 2ty = 0 \quad \text{для} \quad t \in [20, 45]. \quad (6)$$

**Решение.** По условию задачи  $a_0(t) = 2t$ . Пусть  $\omega^2 \leq a_0(t) \leq \Omega^2$  на указанном в условии задачи промежутке  $t \in [20, 45]$ . Сравним решения данного уравнения с решениями уравнений с постоянными коэффициентами:

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0, \quad \omega > 0 \quad \text{и} \quad (7)$$

$$\ddot{u} + \Omega^2 u = 0, \quad \Omega > 0, \quad (8)$$

решения которых представимы соответственно в виде

$$z(t) = C_1 \sin(\omega t + C_2) \quad \text{и}$$

$$u(t) = D_1 \sin(\Omega t + D_2).$$

Рассмотрим вначале пару уравнений (6) и (7). Пусть  $t_{1z}$  и  $t_{2z}$  — последовательные нули уравнения (7), то есть  $t_{2z} = t_{1z} + \frac{\pi}{\omega}$ , а  $t_{1y}$  и  $t_{2y}$  — последовательная пара нулей уравнения (6) на промежутке  $[t_{1z}, t_{2z}]$ . По теореме Штурма имеем

$$t_{1z} \leq t_{1y} < t_{2y} \leq t_{2z}.$$

Откуда получаем оценки

$$t_{2y} \leq t_{2z} = t_{1z} + \frac{\pi}{\omega} \leq t_{1y} + \frac{\pi}{\omega}.$$

И окончательно

$$t_{2y} - t_{1y} \leq \frac{\pi}{\omega}. \tag{9}$$

Рассмотрев затем пару уравнений (6) и (8), получаем путем аналогичных рассуждений оценку

$$t_{2y} - t_{1y} \geq \frac{\pi}{\Omega}. \quad (10)$$

Вернемся теперь к условию исходной задачи и рассмотрим два крайних значения параметра:  $\omega$  и  $\Omega$ , для которых

$$0 < \omega^2 = 40 \leq 2t \leq 90 = \Omega^2 \quad \forall t \in [20, 45].$$

Для указанного промежутка  $t$  расстояние  $d$  между соседними нулями исходного уравнения в силу оценок (9) и (10) будет удовлетворять системе неравенств

$$\frac{\pi}{\Omega} \leq d \leq \frac{\pi}{\omega}.$$

Откуда получаем искомую оценку

Решение  
получено.

$$0.3 < \frac{\pi}{3\sqrt{10}} \leq d \leq \frac{\pi}{2\sqrt{10}} < 0.5.$$

**Задача** Доказать, что нетривиальные решения уравнения  
2.

$$\ddot{y} + \alpha \left( \sqrt{\frac{3-t}{2}} - \sqrt{t} \right) y = 0 \quad (11)$$

имеют

- при  $\alpha = 12$  не более трех нулей ;
- при  $\alpha = \frac{1}{4}$  не более одного нуля.

**Решение.** Исследуемое уравнение относится к виду (4). Установим вначале свойства функции  $a_0(t)$ , позволяющие воспользоваться утверждениями теоремы Штурма и ее следствий. Во-первых, очевидно, что функция  $\left(\sqrt{\frac{3-t}{2}} - \sqrt{t}\right)$  определена при  $t \in [0, 3]$  и является монотонно убывающей на этом отрезке, поскольку

$$\frac{d}{dt} \left( \sqrt{\frac{3-t}{2}} - \sqrt{t} \right) = -\frac{1}{4\sqrt{\frac{3-t}{2}}} - \frac{1}{2\sqrt{t}} < 0.$$

Значит, она имеет значение  $\sqrt{\frac{3}{2}}$  – максимальную величину на отрезке  $[0, 3]$ , при  $t = 0$ .

Во-вторых, из равенств

$$\sqrt{\frac{3-t}{2}} - \sqrt{t} = \frac{\frac{3-t}{2} - t}{\sqrt{\frac{3-t}{2}} + \sqrt{t}} = \frac{3}{2} \frac{1-t}{\sqrt{\frac{3-t}{2}} + \sqrt{t}}$$

следует, что для указанных в условии задачи значений параметра  $\alpha$  функция  $a_0(t) > 0$  при  $t \in [0, 1)$  и  $a_0(t) \leq 0$  при  $t \in [1, 3]$ .

Рассмотрим теперь отдельно случай  $\alpha = 12$ . При  $t \in [0, 1)$  имеет место оценка

$$a_0(t) \leq 12\sqrt{\frac{3}{2}} < 12 \cdot \frac{4}{3} = 16.$$

Поэтому в качестве уравнения (5) можно использовать (с  $A_0(t) = 16$ ) уравнение

$$\ddot{z} + 16z = 0 \quad \text{с решением } z(t) = C \sin(4t + \phi). \quad (12)$$

Из теоремы Штурма следует, что число нулей нетривиального решения уравнения (11) на полуинтервале  $[0, 1)$  не превосходит  $N+1$ , где  $N$  – число нулей нетривиального решения уравнения (12) на том же промежутке.

Расстояние между последовательными нулями решения  $z(t)$  равно  $d = \frac{\pi}{4}$ , поэтому  $N^*$  – минимально возможное число таких нулей на полуинтервале  $[0, 1)$  – равняется

$$N^* = \left[ \frac{\text{длина}\{ [0, 1) \}}{d} \right] = \left[ \frac{1}{\pi/4} \right] = 1.$$

Следовательно, максимальное число нулей нетривиального решения уравнения (11) на полуинтервале  $[0, 1)$  не превосходит  $N^* + 1 = 2$ .

На отрезке  $[1, 3]$  для уравнения (11) оказывается справедливым следствие 1, что означает наличие у нетривиального решения этого уравнения не более чем одного нуля. Таким образом, нетривиальное решение уравнения (11) на отрезке  $[0, 3]$  в совокупности может иметь не более трех нулей.

В заключение рассмотрим случай  $\alpha = \frac{1}{4}$ . Повторив рассуждения, проведенные для случая  $\alpha = 12$ , получим оценку

$$a_0(t) \leq \frac{1}{4} \sqrt{\frac{3}{2}} < \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3}.$$

Тогда в качестве уравнения (5) (в паре к (11)) можно взять уравнение

$$\ddot{z} + \frac{1}{3}z = 0 \quad \text{с решением} \quad z(t) = C \sin\left(\frac{t}{\sqrt{3}} + \phi\right), \quad (13)$$

у нетривиального решения которого расстояние между соседними нулями равно  $\pi\sqrt{3} > \left| [0, 3] \right| = 3$ .

Это означает, что уравнение (13) имеет нетривиальное решение, у которого нет нулей на отрезке  $[0, 3]$ . Но тогда

**Решение**  
получено.

нетривиальное решение уравнения (11) может иметь на этом отрезке не более одного нуля.

В приложениях часто встречаются уравнения, содержащие малый параметр при старшей производной. Исследование асимптотического поведения решений при стремлении значения этого параметра к нулю может оказаться достаточно сложной проблемой, что демонстрирует

**Задача 3.** Найти  $y(t, \varepsilon)$  – решение краевой задачи, где  $\varepsilon$  – малый по модулю параметр, и  $t \in [0, 1]$  :

$$\varepsilon \ddot{y} + \dot{y} = F(t), \quad (14)$$

при условиях

$$y(0) = 1 \quad \text{и} \quad y(1) = 2 \quad (15)$$

для

- а)  $F(t) = 2$  ,
- б)  $F(t) = 1$  .

Решение. 1°. Рассмотрим вначале случай  $F(t) = 2$ .

Корнями характеристического уравнения  $\varepsilon\lambda^2 + \lambda = 0$  являются числа  $\lambda_1 = 0$  и  $\lambda_2 = -\frac{1}{\varepsilon}$ , и общее решение однородного уравнения будет

$$y(t, \varepsilon) = C_1 + C_2 \exp\left(-\frac{t}{\varepsilon}\right).$$

Поскольку для  $\lambda_1 = 0$  мы имеем резонансный случай, то в качестве частного решения неоднородного уравнения (14) можно взять функцию  $y(t) = 2t$ . Тогда его общее решение будет

$$y(t, \varepsilon) = C_1 + C_2 \exp\left(-\frac{t}{\varepsilon}\right) + 2t,$$

где  $C_1$  и  $C_2$  – произвольные константы.

Решим теперь краевую задачу. Для определения значений констант  $C_1$  и  $C_2$  используем краевые условия (15), из которых следует, что

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 + \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right)C_2 + 2 = 2. \end{cases}$$

Откуда получаем

$$C_1 = \frac{1}{1 - \exp\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}, \quad C_2 = \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right)}$$

и находим решение краевой задачи при  $t \in [0, 1]$ :

$$y(t, \varepsilon) = \frac{1}{1 - \exp\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)} + \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right)} \exp\left(-\frac{t}{\varepsilon}\right) + 2t.$$

2°. Исследуем теперь вид найденного решения краевой задачи. Имеем при  $\varepsilon > 0$

$$\dot{y}(t, \varepsilon) = -\frac{\frac{1}{\varepsilon} \exp\left(-\frac{t}{\varepsilon}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right)} + 2,$$

откуда следует, что  $\dot{y}(t, \varepsilon) = 0$  при

$$t = -\varepsilon \ln\left(2\varepsilon \left(1 - \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)\right).$$

А вторая производная  $\ddot{y}(t, \varepsilon)$  строго знакопостоянна  $\forall t \in [0, 1]$ . Следовательно, функция  $y(t, \varepsilon)$  имеет экстремум для достаточно малых по модулю  $\varepsilon$  (минимум при положительных  $\varepsilon$  и максимум при отрицательных).

Графики функций  $y(t, \varepsilon)$  для

$$\varepsilon = 0.25, 0.1, 0.01, 0.003$$

показаны на рис. 1.

Исследование при  $\varepsilon < 0$  сводится к уже рассмотренному случаю при помощи замены переменной  $t$  на  $-t$ .  
Графики функций  $y(t, \varepsilon)$  для

$$\varepsilon = -0.25, -0.1, -0.01, -0.003$$

также приведены на рис. 1.

3°. Отметим важный факт, следующий из предыдущего рассмотрения:

пределный переход  $\varepsilon \rightarrow 0$ , выполненный в *решении* задач (14) — (15) приводит к результату, отличающемуся от результата предельного перехода в *условиях* этих задач.

Действительно, если в уравнении (14) положить  $\varepsilon = 0$  и оставить лишь одно краевое условие  $y(0) = 1$ , то мы получим решение для уравнения первого порядка  $\dot{y} = 1$  вида  $y(t) = 2t$ .

Эта функция является решением соответствующей задачи Коши для уравнения с  $\varepsilon = 0$ . При этом решение исходного уравнения  $y(t, \varepsilon)$  сходится к решению задачи Коши на всем полуинтервале  $(0, 1]$ , но неравномерно.

Данное решение будет близко к решению задачи (14)–(15) везде на отрезке  $[0, 1]$ , за исключением малой окрестности точки  $t = 0$ , где решения будут значительно отличаться.

Эту окрестность принято называть *пограничным слоем*, а отмеченное различие решений – *поведением типа пограничного слоя*. Математически природа эффекта пограничного слоя вполне очевидна: возмущенное уравнение (то есть уравнение (14) с  $\varepsilon \neq 0$ ) есть уравнение второго порядка, в то время как невозмущенное является уравнением первого порядка, решения которого могут не удовлетворять двум различным крайевым условиям.

В заключение обратим внимание на то, что

во-первых, эффект пограничного слоя возникает не при любом возмущении. Например, в случае б) при  $F(t) = 1$  (проверьте это самостоятельно) решение невозмущенной задачи имеет вид  $y(t) = t + 1$  и является как решением каждой из двух невозмущенных задач Коши с начальными условиями  $y(0) = 1$  и  $y(1) = 2$ , так и решением краевой возмущенной задачи при любом  $\varepsilon$ .

И, во-вторых, пограничный слой образуется у решения  $y(t, \varepsilon)$  в разных местах отрезка  $[0, 1]$  при разных предельных переходах:  $\varepsilon \rightarrow +0$  и  $\varepsilon \rightarrow -0$ .

Решение  
получено.




Рис. 1

## АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ И УРАВНЕНИЕ БЕССЕЛЯ

Пусть однородное уравнение

$$a_2(\tau)y'' + a_1(\tau)y' + a_0(\tau)y = 0 \quad a_2(\tau) \neq 0$$

приведено к виду  $u'' + (1 + f(\tau))u = 0$ , где  $|f(\tau)| \leq \frac{C}{\tau^{1+\alpha}}$   $C > 0, \alpha > 0$ .

Тогда последнее уравнение будет иметь решения, для которых при  $\tau \rightarrow +\infty$

$$u(\tau) = C_1 \cos \tau + C_2 \sin \tau + O\left(\frac{1}{\tau^\alpha}\right).$$

Уравнение вида  $x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0$  (где  $p$  - вещественный параметр) называется *уравнением Бесселя*.

Пример 01. Построить асимптотическую оценку решений для уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0 ,$$

для значений параметра  $|p| \leq \frac{1}{2}$ .

Решение: Заметим, что замена неизвестной функции на функцию вида  $y(x) = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}$

приводит к уравнению  $u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - p^2}{x^2}\right)u = 0$ .

При  $|p| < \frac{1}{2}$  можно использовать асимптотическую оценку с  $\alpha = 1$ ,

которая имеет вид  $u(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + O\left(\frac{1}{x}\right)$ . Откуда

окончательно

$$y(x) = \frac{C_1 \cos x + C_2 \sin x}{\sqrt{x}} + O\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right).$$

Заметим, что при  $|p| = \frac{1}{2}$  уравнение Бесселя решается точно

$$y(x) = \frac{C_1 \cos x + C_2 \sin x}{\sqrt{x}}.$$

Пример 02. Доказать, что уравнение Бесселя  $x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0$  не может иметь в положительной полуокрестности нуля  $x \in (0, +\infty)$  двух, ограниченных вместе со своими производными, частных линейно независимых решений.

Решение: Пусть  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  суть два частных линейно независимых решения уравнения Бесселя. Тогда их вронскиан будет

$$W(x) = \det \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

Если функции  $y_1(x)$  и  $y_2(x)$  ограничены вместе со своими производными, то будет ограничен и их вронскиан

$$\begin{aligned} |W(x)| &= \left| \det \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \right| = |y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)| \leq \\ &\leq |y_1(x)| \cdot |y_2'(x)| + |y_2(x)| \cdot |y_1'(x)|. \end{aligned}$$

Однако, этого быть не может, поскольку по формуле Лиувилля-Остроградского

$$W(x) = W(1) \cdot \exp\left(-\int_1^x \frac{du}{u}\right) = W(1) \cdot e^{-\ln x} = \frac{W(1)}{x}.$$

То есть,  $|W(x)| \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow +0$ .

Пример 03. Построить асимптотическую оценку решения для уравнения

$$y'' + e^{2x}y = 0 .$$

Решение: 1. Сделаем замену неизвестной функции  $t = \varphi(x) \Rightarrow x = \psi(t)$ . Пусть  $z(t) = y(\psi(t))$ .

Дифференцирование по  $t$  будем обозначать верхней точкой. Тогда, по правилам дифференцирования имеем

$$y' = \dot{z} \varphi' \quad \Rightarrow \quad y'' = \ddot{z} (\varphi')^2 + \dot{z} \varphi''$$

Для данного в условии уравнения удобно принять  $\varphi(x) = e^x$ , поскольку в этом случае  $\varphi' = \varphi'' = e^x$ , а исходное уравнение принимает вид

$$e^{2x} \ddot{z} + e^x \dot{z} + e^{2x} z = 0 \quad \text{или} \quad \ddot{z} + \frac{1}{t} \dot{z} + z = 0 .$$

2. Избавимся от слагаемого с  $\dot{z}$  при помощи замены  $z(t) = a(t)u(t)$ , подобрав подходящего вида функцию  $a(t)$ . Имеем

$$\dot{z} = \dot{a}u + a\dot{u} \quad \Rightarrow \quad \ddot{z} = \ddot{a}u + 2\dot{a}\dot{u} + a\ddot{u}.$$

Откуда  $a\ddot{u} + \left(2\dot{a} + \frac{a}{t}\right)\dot{u} + \left(\ddot{a} + \frac{\dot{a}}{t} + a\right)u = 0$ . И искомая функция  $a(t)$

определяется уравнением  $2\dot{a} + \frac{a}{t} = 0$ .

Используя интегрирующий множитель  $ta$ , приходим к равенству

$$t2a\dot{a} + a^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (ta^2) = 0,$$

в силу которого можно взять  $a(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ . То есть, будем делать замену

неизвестной функции  $z(t) = \frac{u(t)}{\sqrt{t}}$ .

3. Подставляя это выражение в уравнение для  $z(t)$ , получим (проверьте

это самостоятельно)  $u'' + \left(1 + \frac{1}{4t^2}\right)u = 0$ .

Теперь можно записать асимптотическое решение (с  $\alpha = 1$ )

$$u(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + O\left(\frac{1}{t}\right)$$

Откуда  $z(t) = \frac{C_1 \cos t + C_2 \sin t}{\sqrt{t}} + O\left(\frac{1}{t\sqrt{t}}\right)$  и, окончательно,

$$y(x) = C_1 e^{-\frac{x}{2}} \cos e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} \sin e^x + O\left(e^{-\frac{3x}{2}}\right)$$