

Первые интегралы систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Для описания поведения решений автономной системы

$$\dot{x} = F(x), \quad x \in \Omega \subseteq E^n, \quad (1)$$

где $F(x)$ непрерывно дифференцируемая, вещественная вектор-функция, а $x(t) t \in T$ – решение системы (1) на промежутке T , в окрестности неособых точек (или особых точек, где линеаризация не применима) оказываются полезными функции, носящие название первых интегралов.

Определение 1.	Непрерывно дифференцируемая в Ω функция $u(x)$ называется <i>первым интегралом</i> системы (1), если $u(x(t)) \equiv \text{const } \forall t \in T$ для каждого решения $x(t)$ этой системы.
-------------------	---

Тривиальным примером первого интеграла может служить функция $u(x) \equiv const$. Условия же существования нетривиальных первых интегралов формулируются с помощью понятий *производной в силу системы* и *функциональной независимости* первых интегралов.

**Определение
2.**

Первые интегралы $\{u_{(k)}(x), k = [1, s], s \leq n\}$ называются *функционально независимыми* в точке $a \in \Omega$, если ранг матрицы Якоби равен s , то есть,

$$\operatorname{rg} \left(\left\| \frac{\partial u_{(k)}}{\partial x_j} \right\| \Big|_{x=a} \right) = s, \quad \text{где } k = [1, s], j = [1, n].$$

Согласно этому определению, функциональная зависимость, исходя из известной теоремы о неявных функциях, означает возможность функционально выразить (локально) один первый интеграл через другой.

Следует также отметить различие понятий функциональной зависимости и линейной зависимости. Из линейной зависимости следует функциональная, но не наоборот. Пример: функционально зависимые функции $u_{(1)}(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ и $u_{(2)}(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2$ в E^2 линейно независимы.

Критерий существования первого интеграла описывает

Теорема 1 . Для того чтобы непрерывно дифференцируемая в области Ω функция $u(x)$ являлась первым интегралом системы (1), необходимо и достаточно, чтобы $\dot{u}(x)$ – производная от $u(x)$ в силу системы (1) – равнялась нулю на каждом решении системы (1).

Доказательство.

Пусть $x(t)$ некоторое решение системы (1). Рассмотрим функцию $v(t) = u(x(t))$. Согласно правилу дифференцирования сложной функции

$$\dot{v}(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \dot{x}_j(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} F_j(x(t)) = \dot{u}(x(t)).$$

Откуда мы имеем для первого интеграла

$$u(x(t)) = \text{const} \iff \dot{u}(x(t)) = 0 \iff \dot{v}(t) = 0 \quad (2)$$

А по теореме Коши через каждую неособую точку Ω проходит некоторая фазовая траектория системы (1), на которой выполняются соотношения (2).

Теорема доказана.

Выясним теперь геометрический смысл первого интеграла. Пусть $\frac{\partial u}{\partial x_j} \neq 0$ для некоторого j и пусть C – любое из значений первого интеграла $u(x)$, принимаемых в Ω . Тогда уравнение $u(x) = C$ задает в E^n ($n - 1$)-мерную гиперповерхность Γ , на которой целиком лежат фазовые траектории системы (1).

Действительно, пусть точка a принадлежит поверхности Γ , тогда $u(a) = C$. Поскольку $u(x)$ первый интеграл, то в любой точке фазовой траектории $x(t)$, проходящей через a , будет $u(x(t)) = C$. Значит, вся эта траектория лежит на Γ .

Заметим, что обратное не верно: не любая линия на поверхности уровня есть фазовая траектория.

Если известен первый интеграл $u(x)$, у которого $\frac{\partial u}{\partial x_j} \neq 0$ для некоторого j , то система (1) может быть сведена к системе с меньшим на единицу числом неизвестных функций. Для этого следует x_j выразить при помощи уравнения $u(x) = C$ через остальные неизвестные и подставить это выражение во все (кроме j -го) уравнения исходной системы (1).

Знание же $n - 1$ функционально независимых первых интегралов позволяет получить решение системы (1) в квадратурах.

Поскольку любая непрерывно дифференцируемая функция от нескольких первых интегралов системы (1) очевидно также является ее первым интегралом, то первых интегралов у этой системы бесконечно много.

При этом однако возникает вопрос о том какое число из них может оказаться *функционально независимыми*.

Ответ на данный вопрос находится при помощи нижеследующих рассуждений.

Система (1) в неразвернутом матричном виде записывается так:

$$\|\dot{x}\| = \|F(x)\|, \quad x \in \Omega \subseteq E^n. \quad (3)$$

При гладкой обратимой замене переменных $\|x\| = \|g(y)\|$ с матрицей Якоби

$$\|G(y)\| = \left\| \frac{\partial g_i}{\partial y_j} \right\| \quad \forall i, j = [1, n]$$

и якобианом

$$\det \|G(y)\| = \frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \neq 0 \quad \forall y \in \Omega^*,$$

в области Ω^* , являющейся образом области Ω , автономная система (3) примет вид

$$\|\dot{y}\| = \|G(y)\|^{-1} \|F(g(y))\|, \quad y \in \Omega^* \subseteq E^n. \quad (4)$$

Система (4) непосредственно получается из (3) в силу равенств

$$\|\dot{x}\| = \|G(y)\| \|\dot{y}\| = \|F(g(y))\|.$$

На вопрос о том, как связаны первые интегралы автономных систем (3) и (4), отвечает

Теорема 2. Для того чтобы непрерывно дифференцируемая функция $u(x)$, $x \in \Omega$ являлась первым интегралом системы (3), необходимо и достаточно, чтобы функция

$$v(y) = u(g(y)), \quad y \in \Omega^*$$

являлась первым интегралом системы (4).

Достаточные условия существования $n - 1$ функционально независимого первого интеграла системы (3), а также формулу для любого ее первого интеграла, дает

Теорема 3. Пусть точка $a \in \Omega$ не есть положение равновесия системы (3). Тогда

- 1°. В $\omega \subseteq \Omega$ — некоторой окрестности точки a , существует множество, состоящее из $n - 1$ функционально независимых первых интегралов $u_{(1)}(x), u_{(2)}(x), \dots, u_{(n-1)}(x)$.
- 2°. Для любого первого интеграла $u(x)$ найдется непрерывно дифференцируемая функция $\Phi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1})$ такая, что

$$u(x) = \Phi(u_{(1)}(x), u_{(2)}(x), \dots, u_{(n-1)}(x)), \quad x \in \omega.$$

Следует также иметь в виду, что эта теорема гарантирует существование функции Φ лишь в ω — окрестности неособой точки a , но не во всей области Ω .

Что же касается окрестностей положения равновесия, то в них первые интегралы могут как существовать, так и нет. Тут оказывается необходимым дополнительное исследование.

Продемонстрируем теперь некоторые приемы отыскания первых интегралов на примере решения следующих задач.

Основная идея этих приемов – выделение (или искусственное построение) *полных* производных или дифференциалов от сложных функций.

Задача 1. Найти первый интеграл для системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_1^3. \end{cases}$$

Решение. Заметим, что здесь теорема о линеаризации не применима, поскольку положение равновесия линеаризации есть *центр*.

Поступим так: перемножив уравнения исходной системы крест накрест, получим

$$(-x_1 + x_1^3) \dot{x}_1 = x_2 \dot{x}_2 ,$$

откуда $\frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_1^4 - \frac{1}{2}x_2^2 \right) = 0$. Значит, например,

$$u(x_1, x_2) = x_1^2 - \frac{1}{2}x_1^4 + x_2^2$$

Решение есть первый интеграл рассматриваемой системы дифференциальных уравнений.

Задача 2. Найти независимые первые интегралы для системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = y, \\ \dot{z} = x^2 + y^2 + z. \end{cases}$$

при $x > 0, y > 0, z - x^2 - y^2 > 0$.

Решение. Исключая независимую переменную t из первых двух уравнений, получаем $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$, что дает $y = C_1 x$. Значит

$$u_{(1)}(x, y, z) = \frac{y}{x}$$

есть первый интеграл исследуемой системы дифференциальных уравнений.

При поиске первых интегралов для выделения полных производных или дифференциалов нередко оказывается удобным использование следующего *правила пропорций* (или *свойства равных дробей*) :

если

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2} = \dots = \frac{\alpha_m}{\beta_m} = \gamma,$$

то

$$\frac{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m}{k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m} = \gamma,$$

для произвольных, неравных нулю одновременно чисел k_1, k_2, \dots, k_m .

Для использования этого правила запишем исходную систему в так называемом *симметричном виде*, в котором нет явного указания на то, какая из переменных является независимой.

В этом случае для записи системы используются не производные, а дифференциалы:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{x^2 + y^2 + z}.$$

Заметим, что в рассматриваемом случае (по правилу пропорций)

$$\frac{(-2x)dx}{(-2x)x} = \frac{(-2y)dy}{(-2y)y} = \frac{dz}{x^2 + y^2 + z} = \frac{dz - 2xdx - 2ydy}{z - x^2 - y^2},$$

а это дает равенство полных дифференциалов

$$\frac{d(z - x^2 - y^2)}{z - x^2 - y^2} = \frac{dx}{x} \implies \frac{z - x^2 - y^2}{x} = C_2.$$

Из равенства $\frac{z - x^2 - y^2}{x} = C_2$, в свою очередь, получаем другой первый интеграл

$$u_{(2)}(x, y, z) = \frac{z - x^2 - y^2}{x},$$

Решение который очевидно независим от найденного ранее, получено. поскольку он в своей записи содержит переменную z .